C. Albertisi MAINDR. (1). — Les exemplaires que j'ai reçus du Dr GESTRO proviennent, comme ceux que m'avait déjà donnés M. R. OBERTHÜR, du Fly River.

Les neuf espèces suivantes sont actuellement les seules décrites de Nouvelle-Guinée, et elles paraissent particulières à la région :

Colpodes Sloanei MAINDR., — *C. violaceus* CHAUD., — *C. habilis* SLOANE, — *C. Bennigseni* SLOANE, — *C. papuensis* SLOANE, — *C. annulicornis* MAINDR., — *C. Albertisi* MAINDR., — *C. Laglaizei* MAINDR., — *C. Novae Guineae* MAINDR.

A l'exception des *C. habilis, Sloanei* et *violaceus,* qui se rapprochent des formes indochinoises, indomalaises et indiennes, les autres *Colpodes* néoguinéens rentrent dans la catégorie des formes océaniennes, d'une manière générale, s'entend.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Lampyrides [COL.]

par E. OLIVIER.

J'ai reçu, il y a quelque temps, dans un envoi de l'Amérique du Sud, un Lampyride extrêmement remarquable par la conformation toute spéciale de ses antennes. M. le Dr GESTRO ayant bien voulu me communiquer dernièrement une intéressante série d'insectes de ce groupe appartenant au Musée de Gênes, j'y ai trouvé un individu semblable.

Ces deux Lampyrides diffèrent complètement de toutes les espèces déjà connues, et nécessitent la création d'un nouveau genre.

Petalacmis, gen. nov. — Tête complètement recouverte par le prothorax; dernier article des palpes maxillaires épaissi, trapu, sécuriforme. Antennes simples, longues, composées de 9 articles : le 1er plus long que les deux suivants réunis, élargi au sommet; le 2e court, en cône renversé; les 3e à 8e très courts et très serrés; le 9e formé par une lamelle allongée, plate, arrondie au sommet, à bords légèrement flexueux, presque deux fois aussi longue que les 8 articles précédents. Prothorax à bord postérieur droit, à angles nullement saillants. Pattes grêles, dernier article des tarses allongé, à peine plus long que les lobes du précédent; crochets simples. Abdomen fortement

(1) *Bull. Soc. ent. Fr.* [1906], p. 24.

lobé latéralement, pygidium trilobé. — ♂. Appareil lumineux occupant les trois derniers segments du ventre. — ♀. Inconnue.

Ce genre est bien caractérisé par la forme bizarre des antennes dont je donne un dessin fait par mon ami Robert du Buysson. Il ne comprend jusqu'à présent qu'une seule espèce, trouvée dans l'Amérique du Sud, de taille peu considérable et qui offre le faciès d'un petit *Photinus*.

Petalacmis praeclarus, sp. nov. — *Elongatus, subparallelus, brunneus, pubescens; capite nigro; ore et palpis piceis; antennis piceis, prothorace longioribus, novem articulatis, ultimo articulo alteris fere duplo longiore; prothorace elongato, subquadrato, lateribus rectis, antice rotundato, basi recte truncato, angulis haud prominulis, punctato, flavido, macula discoidali brunnea; scutello parvo, triangulari, brunneo; elytris elongatis, subparallelis, rugosis, costulatis, brunneis, sutura et margine externo tenuiter dilutioribus; pedibus piceis; abdominis segmentorum angulis valde retro productis; pygidio trilobato; duobus penultimis ventris segmentis cereis, lucidis.* — ♀. *Ignota.* — Long. : 8 mill.

Bolivie (Mus. de Gênes); Brésil (ma collection).

Trois Hétéromères nouveaux de l'Afrique orientale [Col.]

par Maurice Pic.

Cistela abyssinica, nov. sp. — *Satis elongatus, antice posticeque attenuatus, subconvexus, nitidus, coeruleo-viridescens, palpis, antennis tarsisque nigris, femoribus tibiisque luteis.*

Assez allongé, atténué aux deux extrémités, subconvexe, brillant, d'un bleu verdâtre avec les pattes, sauf les tarses qui sont noirs, jaunes, les antennes et palpes noirs. Tête assez longue; antennes grêles; prothorax plus long que large, assez rétréci antérieurement, presque droit postérieurement, faiblement sinué à la base, avec une faible impression de chaque côté de celle-ci, à ponctuation assez fine et dense; élytres à peine plus larges que le prothorax, subparallèles, acuminés au sommet, à stries ponctuées assez profondes avec les